

目の健康を守
ろう想像力は知識よりも
大切である。

AINSHUTAIN



保健だより

10月とは思えないような暑さが続きましたが、今週は急激に気温が下がり秋らしくなってきました。朝晩と日中の気温差が激しいこの時期は体調を崩しがちになります。夕方の部活動帰りは、汗をよく拭いてから帰るなど体が急激に冷えないように気をつけましょう。

先週は、大きな学校行事の一つである合唱コンクールを2年ぶりに行うことが出来ました。コロナ禍であり数々の制約があった中でしたが、生徒の皆さんがマスクをしていても大きな声で思いの詰まった美しい歌声を響かせていた姿に感動しました。一つの歌になるまでには、たくさんの苦労があったでしょうが合唱を通して、クラスの仲間と心を通わせることが出来たことは何よりの宝だと思います。素晴らしい歌声を聴かせてもらい良い日でした。

令和3年度 五中 裸眼視力の結果



R3年度 5中視力検査の結果	男子				女子			
	1年	2年	3年	計	1年	2年	3年	計
1.0以上	31	32	9	72	23	13	9	45
1.0未満～0.7以上	3	5	10	18	4	7	2	13
0.7未満～0.3以上	6	12	8	26	3	6	8	17
0.3未満	3	2	7	12	4	3	6	13
矯正(メガネ、コンタクト)	10	3	12	25	9	11	24	44

・1.0以上の視力保持者は男女共に学年が上がるにつれ減少しています。男子の1.0以上の視力を保持しているのは、47%、女子は34%です。(全都的にも中学3年生の男女で、裸眼視力1.0未満の割合が高くなる傾向にあります。)

(裸眼視力、判断の目安)

- 1.0以上 ⇒ 教室での学習に支障はなく、あまり問題ありません。
- 0.7～0.9 ⇒ 教室での学習に不便なこともあります。大きい教室や暗い部屋でのスライドや画面を見るといった場面では、不都合を感じことがあるかもしれません。
- 0.3～0.6 ⇒ 教室での学習に不便なことがあります。授業内容により、小さい字での板書の時は不都合が多いと思われます。
- 0.2以下 ⇒ 教室での学習に不便が明らかにあります。座席の配慮が必要です。眼鏡を使ってどの程度見えるかが大事になります。

いつでも視力検査が出来るよう生徒玄関、2・3階の西流しのところに視力票を貼っています。是非、検査してみてください。気になる人は、放課後に検査します。保健室まで声をかけてください。

意外に片頭痛を訴える
生徒がいます。

中学校保健ニュース

中高生にも多い片頭痛と緊張型頭痛

指導／埼玉精神神経センター 埼玉国際頭痛センター長 坂井 文彦 先生

頭痛で多いのは、ずきずきとした痛みがある片頭痛と、締め付けるような痛みがある緊張型頭痛です。それぞれの症状の特徴と対応法について確認しましょう。

片頭痛

片頭痛は頭の片側、または両側にズキズキと脈打つような痛みがあります。頭痛が起っているときは音や光に敏感になり、音をうるさく感じたり、明るいところに行くと痛みが強くなったりします。吐き気を感じ、嘔吐することもあります。男性よりも女性に多いという特徴があります。

頭の中の血管が拡張し、周囲に炎症が広がることが痛みの原因です。体を動かすと痛みが強くなるため、暗く静かな部屋で安静にしていると楽になります。額やこめかみの痛む

部分を冷やすことで痛みが軽減されます。

片頭痛の前兆としてギザギザの光やオーロラのような模様が見えることがあります。処方された薬がある場合は、前兆を感じたら薬を飲んで、安静にするようにしましょう。




緊張型頭痛

緊張型頭痛は頭全体が締め付けられるように痛むのが特徴です。長時間に及ぶデスクワークで首や頭の筋肉が緊張し、血行が悪くなり、筋肉に疲労物質が蓄積することなどが原因で起こります。

痛みが片側だけに起こったり、音や光に過敏になったり、嘔吐したりすることがないのが片頭痛との違いです。

痛みが筋肉の緊張から来ているので、軽く運動をしたり、入浴したりして血行をよくすることで改善します。

ふだんから正しい姿勢を保ち、同じ姿勢を長く続かないこと、定期的に運動をして筋肉の緊張を解消することなどが緊張型頭痛の予防につながります。



自転車のライト トワイライト・オン



頭痛ダイアリーの活用

いつ、どんな症状の頭痛があったかを記録する頭痛ダイアリーをつけておくと、自分の頭痛はどんなタイプで、どういった状況で起こりやすいかが客観的にわかつてきます。また医療機関を受診する際に、医師に自分の頭痛の症状を伝える際にも役立ちます。

日本頭痛学会のHPからダウンロードできる頭痛ダイアリーでは、月経(生理)の有無、痛みの程度(十、十一、十二の3段階で記入)、飲んだ薬の略称、頭痛の症状、吐き気、前ぶれ、誘因、1日の出来事などが記録できるようになっています。

日付	生産	頭痛の程度			影響度	MEMO (頭痛のタイプ、吐き気、前ぶれ、誘因など)
		午前	午後	夜		
9/13 (月)	痛 頭痛	—	+	+	+	重い痛み、前ぶれあり
14 (火)	痛 頭痛	—	—	—	—	
15 (水)	痛 頭痛	—	—	—	—	
16 (木)	痛 頭痛	—	—	—	—	


一般社団法人 日本頭痛学会の頭痛ダイアリー：
<https://www.jhsnet.net/pdf/headachediary.pdf>

片頭痛の予防と緊張型頭痛の緩和に 頭痛体操

片頭痛予防体操

頭と首を支えている筋肉に疲労がたまり、硬くなっていることが片頭痛の原因の一つです。そのため、この部分の筋肉（インナーマッスル）をストレッチすることで片頭痛を予防します。

正面を向いて足を肩幅に開き、首の骨を軸に頭を動かさずに、両肩を大きくリズミカルに回します。2分間行います。体の軸を意識して、頭を動かさないようにすることがポイントです。



緊張型頭痛体操

緊張型頭痛については、予防だけではなく、頭痛の最中に体操を行うことで痛みを緩和する効果も期待できます。首や肩の筋肉のこりをほぐし、血行をよくすることで頭痛を改善します。

足を肩幅に開き、肘を軽く曲げ、肩を中心にして前から後ろに両腕を内側に回します。「上着を脱ぐ」感じで計10回行います。その後、反対に後ろから前へ、計10回両腕を回します。

